



Recomendaciones para procedimientos de laboratorio de función pulmonar

1. Preparación para la prueba de función pulmonar

- Suspender los inhaladores para el día de la cita según se indica a continuación:
 - De acción corta (Salbutamol): 6 horas antes.
 - De acción larga (formoterol, salmeterol): 8 horas antes.
 - Bromuro de ipatropio (atrovent): 8 horas antes.
 - Bromuro de tiotropio (spiriva): 12 horas antes.
 - Teofilinas: 24 horas antes
 - De acción prolongada: 24 horas antes. (glicopirronio)
- Presentar inhaladores que utiliza e inhalocámara el día de la prueba
- Si es fumador, no fumar al menos 24 horas antes de la prueba
- Si toma medicamentos, tomarlos de manera normal
- No tomar bebidas negras el día de la cita (gaseosas, maltas, café, chocolate, etc.)

2. Recomendaciones para la prueba de función pulmonar:

- Presentar documento de identidad en físico y original, orden y autorización firmada y sellada por la EPS para realizar el estudio
- Tener en cuenta que el uso del tapabocas es obligatorio para el ingreso a la IPS
- Presentar resultados de baciloscopias y mycobacterium. si el médico los ha solicitado
- Evitar el uso de ropa ajustada que limite movilidad y/o respiración
- Evitar hacer ejercicio o actividad física dos horas antes de la prueba
- Evitar ingerir alimentos dos horas antes de la prueba
- Utilizar zapatos cerrados
- Informar al profesional si presenta alguna condición médica que le impida realizar esfuerzo físico
- Si es menor de edad debe venir en compañía de un familiar adulto.
- Si su prueba es capacidad de difusión de monóxido de carbono y usa oxígeno complementario debe suspender 20 minutos antes el uso (si usa inhalador puede aplicarlo)

Tener en cuenta que seguir la preparación y recomendaciones es de vital importancia para poder realizar los respectivos procedimientos